TU Dresden, Professur für Meteorologie

Welche Herausforderungen stellt der regionale Klimawandel an die Gestaltung von Stadtquartieren?

Astrid Ziemann

Mit Beiträgen von Valeri Goldberg, Uta Moderow, Christian Bernhofer

Sächsische Zeitung
15.08.2018
Bäume in Städten wichtig zur Verringerung von Hitzebelastung

Studie zum Schutz vor Hitze in Städten
Dresden/Erfurt. Stadtbewohner sollen in ihrem Wohnumfeld besser vor Hitze geschützt werden. Diesem Ziel dient das Forschungsprojekt „Hitzeresiliente Stadt- und Quartiersentwicklung“ in Großstädten, bei dem Wissenschaftler die aktuelle

DAWO
Projekt zur Sommerhitze in Gorbitz gestartet

Die Temperaturen schnellen im Sommer oftmals in die Höhe. Welche Auswirkungen hat das z.B. auf die Lebensqualität in dicht bebauten Stadtgebieten? (Foto: Pixabay)

DNN
Dresdner Klimaexperte: „Diese Hitze wird hier in 50 Jahren normal sein“

Der Schweiß tropft bei der kleinsten Bewegung, Tiere finden kein Wasser mehr und auch nachts kühlt es nicht ab. Scheint, der Klimawandel ist in Dresden angekommen. Die DNN haben den TU-Klimaexperten Valeri Goldberg nach Erklärungen gefragt. Steht uns der heißeste Sommer aller Zeiten bevor?

MDR AKTUELL
Das können Großstädte gegen die Hitze tun

Die bisher heißesten Tage dieses Sommers stehen bevor. In Mitteleuropa sollen die Temperaturen bis auf 34 Grad klettern. Was im Schattenplatz am See noch schön sein kann, wird im Büro und in der eigenen Wohnung oft zur Last. Dass das nicht von heute auf morgen geändert werden kann, ist klar. Doch ein paar gute Ideen für hitzerobuste Städte, die gibt es schon.

DNN
TU misst in Gorbitz Hitzebelastung

Für eine Studie wird gegenwärtig die Hitzebelastung in der Stadt am Beispiel von Dresden-Gorbitz wissenschaftlich untersucht. Ziel ist, aus den Messergebnissen Maßnahmen ableiten zu können, z. B. wie Wohnungen in Zukunft umgebaut werden sollten und wo das Anlegen beziehungsweise die Erweiterung von Parks in Stadtquartieren nötig wird.

dpa-Newskanal
Forschung zum Schutz vor Sommerhitze in Dresden und Erfurt

Dresden/Erfurt (dpa/sn) - Stadtbewohner sollen in ihrem Wohnumfeld besser vor Hitze geschützt werden. Diesem Ziel dient das Forschungsprojekt "Hitzeresiliente Stadt- und Quartiersentwicklung" in Großstädten, bei denen Wissenschaftler die aktuelle Situation in den Wohngebieten Dresden-Gorbitz und

Sommer 2018 in Dresden: Anzahl der heißen Tage

Wie viele heiße Tage ($T_{\max} \geq 30^\circ\text{C}$) wurden an der Wetterstation Dresden-Klotzsche 2018 registriert?

Referenz-Klimanormalperiode 1961-1990: 6 (Vergleich: 1981-2010: 8)

Sommer 2018 in Dresden: Anzahl der heißen Tage

Heiße Tage ($T_{\max} \geq 30$) in Dresden Wahnsdorf/Klotzsche, 1917-2018

Referenz-Klimanormalperiode 1961-1990: 6 (Vergleich: 1981-2010: 8)

Weltklimarat IPCC, 5. Sachstandsbericht 2013-2014

Weltklimarat IPCC, 5. Sachstandsbericht 2013-2014

- Anstieg der mittleren globalen Oberflächentemperatur über den meisten Landflächen
- Hohe räumliche Variabilität
- **Häufigere** heiße und weniger kalte **Temperaturextreme** auf täglicher und jahreszeitlicher Zeitskala

Änderung der Verteilung von Klimagrößen

→ Bereits geringe Änderungen der Mittelwerte können durchaus große Auswirkungen auf die statistische Verteilung der Extremwerte haben.

Welche Auswirkungen kann der globale Klimawandel auf Regionen haben?

- Übertragung der globalen Klimamodellprojektionen auf die regionale und lokale Skala durch **Downscaling-Verfahren**:
 - **Dynamisch**: mit regionalen Klimamodellen
 - **Statistisch-dynamisch**: mit statistischen Beziehungen zwischen großskaligen Strömungsmustern und lokalen Wettererscheinungen (Nutzung von gemessenen Stationsdaten)

McGuffie, Henderson-Sellers, The Climate Modelling Primer, 2014

Klima der Oberlausitz – abwechslungsreich und besonders

geographische **Lage/Meer**:
Änderung von West → Ost,
Niederschlag und Temperatur

Höhenlage:
Änderung von Nord →
Süd, Temperatur,
Niederschlag
Globalstrahlung

**Relief und die
Landnutzung:**
mikroklimatische
Einflüsse

Ziemann und Goldberg: Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2020, Oberlausitzer Verlag

Klimadiagramm von Görlitz und räumliche Verteilung der Globalstrahlung in der Oberlausitz (1981-2010)

Ziemann und Goldberg: Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2020, Oberlausitzer Verlag

→ Höhere Kontinentalität: Höhere Jahresschwankung der Temperatur, tiefere Wintertemperaturwerte, mehr Sonnenstunden

Räumliche Verteilung der Temperatur und des Niederschlags in der Oberlausitz (1981-2010)

Ziemann und Goldberg: Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2020, Oberlausitzer Verlag

- Abhängigkeit der Temperatur von der Geländehöhe
- Niederschlagsverteilung → Hauptwindrichtung in Bezug auf Lage der Gebirge

Böhmischer Wind: kalter Fallwind aus dem Böhmischem Becken

Ziemann und Goldberg: Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2020, Oberlausitzer Verlag

- Voraussetzung: Hochdruckgebiet über dem östlichen Mitteleuropa und tiefer Druck nördlich und westlich davon → Kaltluftschicht im Böhmischem Becken

Böhmischer Wind: Windgeschwindigkeit und Temperatur am 12.01.2009

Ziemann und Goldberg: Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2020, Oberlausitzer Verlag

→ Überströmen der Gebirgsschwelle der Oberlausitz bzw. dem Einströmen in die Flusstäler (z.B. Elbe und Neiße): Beschleunigung der Kaltluft

Wohin fährt der „Klimazug“ in der Oberlausitz?

Ort	Zeitperiode für die Projektion: 2021-2050	Zeitperiode für die Projektion: 2071-2100
Jonsdorf	-67 mm	-141 mm
Löbau	-66 mm	-132 mm
Oppach	-69 mm	-151 mm
Weißenberg	-40 mm	-125 mm

Ziemann und Goldberg: Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2020, Oberlausitzer Verlag

→ Abnahme des Jahresniederschlags (vor allem im Sommerhalbjahr)
→ Zeitliche Ausdehnung der sommerlichen Niederschlagscharakteristik: Wechsel von Phasen mit Starkniederschlägen und Trockenphasen

Wohin fährt der „Klimazug“ in der Oberlausitz?

- im Mittel im **Sommer um 3-4°C höhere Tmax**
- **Häufigkeit von heißen Tagen** im Sommer **steigt** gegenüber heute um das **Vierfache**
- **Extremwerte** von bis zu 40 °C

Ziemann und Goldberg: Oberlausitzer Familien-Kalenderbuch 2020, Oberlausitzer Verlag

→ Zunahme der Temperatur in der Oberlausitz:

- in der nahen Zukunft um ca. 1,5°C
- in der fernen Zukunft um über 3,5°C

Besonderheiten des Stadtklimas

https://www.deutschesklimaportal.de/DE/Themen/3_Stadtklima

- dichte Bebauung und hoher Versiegelungsgrad, wenig Grün- und Wasserflächen
- Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Strahlung und Wind, immissionsrelevante Größen (z. B. Luftqualität, Abwärme und Lärm)

Stadtklima - Temperaturverteilung in der Nacht: Urbane Wärmeinsel

Temperaturunterschiede in einer Sommernacht im Stadtgebiet von Dresden

Max. Differenz: 8 K

→ Vegetationsflächen am kühlfsten

→ Stärkste Abkühlung über Wiese

Temperaturverlauf (trendkorrigiert) während einer Messfahrt in Dresden am 28.08.2013, 22:59 MEZ – 29.08.2013, 00:36 MEZ (BSc Arbeit S. Mittag)

Abweichung des Stadtklimas gegenüber dem Umland (typische, langfristige Werte)

Lufttemperatur in Bodennähe	+ 1 K ... +3 K
Globalstrahlung	-15 % ... -20 %
ultraviolette Strahlung	-10 % ... -30 %
Sonnenscheindauer	+5 % ... -15 %
Relative Feuchte in Bodennähe	-2 % ... -10 %
Bewölkungsgrad	+5 % ... +10 %
Windgeschwindigkeit	-10 % ... -30 %
Aerosolgehalt der Luft	bis +1000%

fett: gesicherte Werte

nach Landsberg (1969) und Schönwiese (1979)

Energieumsatz: Abhängigkeit von der Stadtstruktur

Oberflächentemperaturwerte im Tagesgang

<https://www.staedtebauliche-klimafibel.de/?p=6&p2=2.3>

Temperaturen verschiedener Oberflächen an einem Hochsommertag (nach FETZER, 1975)

Beispielquartier Dresden Gorbitz

Oberflächentemperaturwerte im Tagesgang

Gorbitz, 07.06.2018, Envimet 3.1

Mittelwert Oberflächentemperaturwerte tagsüber

Gorbitz, 07.06.2018, Envimet 3.1

Rucksackmessungen in Dresden Gorbitz

Kartenquelle: openstreetmap

Lufttemperatur am 07.06.18: Rucksackmessung

Rucksackmessungen in Dresden Gorbitz am 07.06.18: Strahlung und Temperatur an einem Tag mit Wolken

Thermische Behaglichkeit – der Klima-Michel

„Durchschnittsmensch“
35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und
75 Kilogramm schwer

Komponenten der Strahlungsbilanz:

I	Direkte Sonnenstrahlung	M-W	Wärmeproduktion durch Energiestoffwechsel
D	Diffuse Sonnenstrahlung	{c}	Wärmeisolation der Bekleidung
R	Reflexstrahlung (kurzwellig)	Q_H	turbulenter Fluß fühlbarer Wärme (Konvektion)
A	Wärmestrahlung der Atmosphäre	Q_{SW}	turbulenter Fluß latenter Wärme
E	Wärmestrahlung der Oberflächen	Q_L	sensibler Fluß latenter Wärme durch Wasserdampfdiffusion
E_{KM}	Wärmestrahlung des Menschen	Q_{RE}	Wärmefluß über Atmung (fühlbar und latent)

<https://www.staedtebauliche-klimafibel.de/>

Verändert nach VDI 3787 Blatt 2

Thermische Behaglichkeit – der Klima-Michel

Bewertung der thermischen Behaglichkeit bzw.
Belastung mit verschiedenen Indizes, z.B.

- **PET** (Physiologic Equivalent Temperature)

Die PET ist für eine beliebige Stelle im Freien definiert als diejenige Außentemperatur, bei der in einem Innenraum die Wärmebilanz eines Menschen bei gleichen Werten der Haut- und Kerntemperatur ausgeglichen ist wie bei den Bedingungen im Freien (siehe auch VDI Richtlinie 3787 Blatt 2).

- **UTCI** (Universal Thermal Climate Index)
- **Gefühlte Temperatur** (→DWD-Webseite, Hitzewarnung)

Thermische Behaglichkeit am 07.06.18

→ Schatten verringert Hitzebelastung um bis zu zwei Belastungsstufen

Thermische Belastung um 10 Uhr am 07.06. (Dresden Gorbitz)

➤ Primäre Einflussgröße auf die Hitzebelastung tagsüber: Kurzweilige Einstrahlung

Thermische Belastung um 4 Uhr am 07.06. (Dresden Gorbitz)

➤ Primäre Einflussgrößen auf die thermische Behaglichkeit nachts: Wärmestrahlung

Thermische Belastung am 07.06. (Dresden Gorbitz)

Dresden-Gorbitz, 07.06.2018, Envimet 3.1

➤ Kombination aus Schattenwirkung und Ausstrahlung: Hitzeschutz im Freiraum → Bäume

Stadtklimasimulation Erfurt Oststadt

Stauffenbergallee, Leipziger und Hanseplatz

Rathenaustr.

Alter Posthof

Kartenquelle: GoogleEarth

Thermische Belastung am 07.06. (Erfurt Oststadt)

Erfurt-Oststadt, 07.06.2018, Envimet 3.1

Hitzebelastung

extrem

sehr stark

stark

moderat

➤ Kombination aus Schattenwirkung und Ausstrahlung: Hitzeschutz im Freiraum → Bäume

Stadtvegetation der Zukunft: hitzetolerant und trockenstressresistent

Eignungsempfehlung für Straßenbäume auf Basis baumphysiologischer Messungen **in Dresden** (Gillner und Roloff, 2014)

→ **Planungsdatenbank: <https://citree.de/>**

Klimatische Wirkung von urbanem Grün

Urbanes Grün verbessert das Stadtklima in vielerlei Hinsicht: geringere Wärmebelastung, stoffliche und Lärmbelastung.

Die Klimafunktion von Stadtvegetation hängt stark von der **Flächengröße** ab:

- Klimafunktion kleiner Grasinseln kaum messbar
- Klimafunktion von Einzelbäumen: **Schattenwirkung**

Für eine optimierte Wirkung bedarf es:

- einer **Vernetzung** von Grünflächen (Reduzierung von kumulativem Wärmestress)
- einer angrenzenden Bebauung, die einen **Austausch mit der Umgebung** zulässt

→ **Dachbegrünung und Fassadenbegrünung** kann bodengebundene Formen urbanen Grüns sinnvoll ergänzen.

→ **Ausreichende Wasserversorgung** ist unabdingbar, um von den Ökosystemleistungen urbanen Grüns entsprechend „profitieren“ zu können.

Wichtige Herausforderung des Klimawandels an die Gestaltung von Stadtquartieren:

→ Verringerung der thermischen Belastung von Bewohnern in Hitzeperioden

Tagsüber:

- Verringerung der solaren Einstrahlung:
 - **Schatten u.a. durch Bäume**
 - Dach- und Fassadenbegrünung für gemäßigtes Innenraumklima
- Verringerung der Wärmeausstrahlung vom Boden und den umgebenden Flächen (FreiRAUM-Gestaltung, geringe Bodenversiegelung mit Asphalt)

Nachts:

- Erhöhung der Wärmeausstrahlung durch **große Freiflächen** mit niederwüchsiger Vegetation (**Wiese**)
- mit Anbindung an das Stadtquartier (**freie Kaltluftflussbahnen, Ventilation**)
- Lockere Baumanpflanzungen (Minimierung möglicher Wärmestaus)

Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit