

GARTEN „HEILBRONN 2.0“ - EINE FACETTENREICHE GESELLSCHAFT


NACHWUCHSWETTBEWERB ZUR REALISIERUNG EINES TEMPORÄREN SCHAUGARTENS ZUR BUNDESGARTENSCHAU HEILBRONN

578774




BLICK RICHTUNG BÜHNE

- ENTSTEHUNG VON SITZ-MÖGLICHKEITEN UND BLICKACHSEN
- INTEGRATION VON SMART SCREENS IN DAS GARTENHAUS



NUTZUNGSPRINZIP

- SONNENSEGEL IN VERSCHIEDENEN MÖGLICHKEITEN
- BESTUHLUNG WÄHREND EINER VERANSTALTUNG




NUTZUNGSPRINZIP FÜR VERANSTALTUNGEN




- VERWENDUNG VON PFLANZEN MIT UNTERSCHIEDLICHER HERKUNFT ALS SINNBILD DER MULTIKULTURELLEN BEVÖLKERUNG BADEN-WÜRTTEMBERGS



BEPFLANZUNGSPRINZIP



PFLANZPLAN M 1:50



REGELDETAIL PFLANZFLÄCHE M 1:10



REGELDETAIL WASSERGEBUNDENE WEGEDECKE M 1:10



REGELDETAIL „SAND-BEET“ M 1:10

| Symbol | Bot. Name | Deutscher Name | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Wuchshöhe | Lebensbereich | Stk./qm | Herkunft |
|--------|--|---------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|-----------|---------------|---------|----------------|
| ● | <i>Papaver orientale</i> „Beauty of Livermere“ | Türkischer Mohn | | | | | | | | | | | | | 100 | Freill., so | 2 | Asien |
| ● | <i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>Sullivantii</i> „goldsturm“ | Sonnenhut | | | | | | | | | | | | | 60 | Freill., so | 4 | Nordamerika |
| ● | <i>Helenium</i> Hybride „Waltraut“ | Sonnenbraut | | | | | | | | | | | | | 80 – 100 | Freill., so | 2 | Amerika |
| ● | <i>Echinacea pallida</i> | Bleicher Scheinssonnenhut | | | | | | | | | | | | | 80 | Freill., so | 8 | Nordamerika |
| ● | <i>Echinops ritro</i> „Veitch's Blue“ | Kugeldistel | | | | | | | | | | | | | 50 – 80 | Freill., so | 4 | Asien |
| ● | <i>Ammophila breviflulata</i> | Blauer Strandhafer | | | | | | | | | | | | | 100 – 130 | Freill., so | 1 | Amerika |
| ▲ | <i>Agastache rugosa</i> „Alabaster“ | Weißer Koreaminze | | | | | | | | | | | | | 60 – 80 | Freill., so | 4 | Asien |
| ● | <i>Perovskia atriplicifolia</i> „Blue Spire“ | Blauraute | | | | | | | | | | | | | 100 – 150 | Freill., so | 1 | Asien |
| ● | <i>Stachys byzantina</i> | Woll-Ziest | | | | | | | | | | | | | 40 – 60 | Freill., so | 6 | Asien |
| ● | <i>Sorghastrum nutans</i> | Goldbartgras | | | | | | | | | | | | | 80 – 130 | Freill., so | 2 | Amerika |
| ● | <i>Deschampsia cespitosa</i> „Bronzeschleier“ | Wald-Schmiele | | | | | | | | | | | | | 60 – 120 | Freill., so | 2 | Europa |
| ● | <i>Santolina rosmarinifolia</i> ssp. <i>rosmarinifolia</i> | Grünes Heiligenkraut | | | | | | | | | | | | | 30 – 50 | Freill., so | 6 | Europa /Afrika |
| ● | <i>Heuchera micrantha</i> „Palace Purple“ | Purpur-glockchen | | | | | | | | | | | | | 30 – 60 | Freill., so | 8 | Nordamerika |
| ▲ | <i>Salvia nemorosa</i> „Amethyst“ | Steppen-Salbei | | | | | | | | | | | | | 70 – 80 | Freill., so | 8 | Europa |
| ▲ | <i>Sanguisorba officinalis</i> „Tanna“ | Purpur-Wiesenknopt | | | | | | | | | | | | | 40 – 40 | Freill., so | 8 | Europa |

